



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA EQUINOS





MISSÃO

Oferecer soluções de excelência para o bem-estar e saúde dos animais, superando as expectativas de nossos clientes e gerando crescimento para nossos colaboradores.

VALORES

- **Paixão:** Amamos o que fazemos, somos dedicados, perseverantes e comprometidos.
- **Humildade:** Respeitamos o ser humano e estamos abertos a novas ideias.
- **Excelência:** Fazemos sempre o nosso melhor.
- **Integridade:** Agimos sempre com ética, honestidade e transparência.
- **Inovação:** Focamos na melhoria contínua e na criação de novas soluções.

HISTÓRIA

A Vetnil foi idealizada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro (in memoriam) e iniciou suas atividades em maio de 1994, na cidade de Louveira, interior de São Paulo. Baseada nas mais recentes pesquisas mundiais na área de nutrição para equinos, iniciou o desenvolvimento de uma linha de produtos até então inédita no Brasil e que hoje é líder no segmento, sendo recomendada pelos melhores veterinários, criadores e treinadores do país. A partir de 1998, a Vetnil se inseriu também no mercado PET, no qual conquistou a confiança de veterinários e criadores. Passou a ser uma excelente opção no cotidiano

desses profissionais, devido aos ótimos resultados colhidos com a utilização de seus produtos, sendo hoje um dos maiores laboratórios nacionais. Em 2000, os produtos Vetnil foram introduzidos nos mercados de animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. Ao longo de sua trajetória, a Vetnil ganhou importantes prêmios, tais como: "Melhores empresas para se trabalhar", divulgado pela Revista Época; "A empresa que mais cresceu no setor veterinário em 2005", divulgado pelo Anuário Exame 2006-2007; "A melhor empresa do setor de produtos veterinários", divulgado pelo Anuário Melhores do Agronegócio - Globo Rural em 2006, 2011, 2015 e 2016, dentre outros.

EMPRESA INTERNACIONAL

A Vetnil está sempre presente nos principais eventos realizados no exterior e atualmente exporta para mais de 15 países, entre eles: Angola, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguai, Peru, Qatar, Eslovênia, Emirados Árabes, Uruguai, Nicarágua e México.



MODERNIDADE E INOVAÇÃO



A Vetnil é reconhecida pela sua constante inovação e criatividade no desenvolvimento de soluções que vêm ao encontro das necessidades do mercado veterinário.

Nos últimos anos, a Vetnil lançou no mercado brasileiro diversos produtos de alta tecnologia, resultado de pesquisa e desenvolvimento próprios, especialmente nas linhas

de suplementos, como o Nutração, o Nutralogic e mais recentemente a Linha Super Premium JCR de suplementos para equinos, uma linha que representa

o que há de mais inovador no mercado mundial de suplementos para equinos. Composta por variados produtos, todos com formulações especiais, a Linha Super Premium JCR é elaborada com matérias-primas de altíssima qualidade, em combinações que maximizam o desempenho e a performance dos animais atletas. Na linha de medicamentos, o destaque é o Condroton oral e injetável (Regenerador Articular), além das pomadas e géis (DM Gel, Alantol, Furanil e Gelo Pan) e outros medicamentos, como o Pulmonil e Bionew. Hoje, a linha completa de produtos Vetnil conta com mais de 100 produtos.

QUALIDADE

Obstinada em manter a qualidade de seus processos, a Vetnil realiza vários testes laboratoriais e a campo, antes do início da comercialização de seus produtos. Para isso, possui parcerias com diversas universidades, criadores e associações. Tanto as matérias-primas quanto os produtos fabricados na Vetnil são submetidos a rigorosas análises em nosso Laboratório de Controle de Qualidade e em outras empresas terceirizadas, para uma melhor confiabilidade nos resultados e garantia da qualidade da linha de produtos.

FUTURO

Em 2003, a Vetnil deu início à implantação de um sonho audacioso, o "PROJETO RECEITUÁRIO DO FUTURO", que visa prestigiar os futuros profissionais veterinários e as mais de 100 instituições que os preparam em todo o Brasil.

O projeto "Receituário do Futuro" surgiu de uma antiga preocupação, que é de levar aos acadêmicos de Medicina Veterinária informações comerciais e inovações terapêuticas trazidas através de produtos veterinários produzidos pelo seu laboratório. Este contato do estudante, com as opções de medicações que ele poderá prescrever, torna-o mais apto e seguro quanto ao conhecimento dos princípios ativos que compõem cada produto e seus respectivos nomes comerciais.

Atualmente, cerca de 70% das instituições, em todo o país, já aderiram ao nosso projeto.

A Vetnil acredita em um futuro brilhante pela frente, assumindo cada vez mais um lugar de destaque. Está sempre atenta à evolução tecnológica e às necessidades do mercado,

para poder atender da melhor forma seus clientes. A Vetnil espera aumentar cada vez mais sua presença no mercado internacional, contribuindo desta forma para a evolução do mercado veterinário brasileiro e mundial.

EQUIPE

Buscando sempre prestar excelência de atendimento a seus clientes, a Vetnil investe cada vez mais em seu pessoal, através de cursos de aprimoramento no Brasil e no exterior, de forma que estes estejam preparados para fornecer serviços de qualidade aos nossos clientes.



BUSCA PELA EXCELÊNCIA

A Vetnil, buscando a constante melhoria em seus serviços e no atendimento de seus clientes, conta com um serviço de Ouvidoria. Esse serviço está disponível a todos os seus clientes e é responsável por receber todas as possíveis reclamações, críticas e sugestões, além de realizar pesquisas, visando a melhoria constante na qualidade dos serviços.

Este serviço está disponível através do telefone 0800 109 197 e também pelo ouvidoria@vetnil.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

A Vetnil também conta com um serviço de atendimento ao cliente, disponível através de atendimento telefônico (0800 109 197), ou através de sua home page (www.vetnil.com.br), no qual pode-se obter mais informações sobre os produtos e esclarecimentos de dúvidas sobre sua utilização.

A Vetnil ainda mantém um relacionamento muito próximo a seus clientes através das redes sociais, por meio dos perfis da marca no Facebook, Instagram e Twitter.



MEDICAMENTOS | LINHA EQUINOS

ACEPRAN® 1%	06
ALANTOL®	08
ALGIVET®	09
AMPICILINA VETERINÁRIA INJETÁVEL 2g	10
AMPICILINA VETERINÁRIA ORAL	12
BIONEW®	14
CONDROTON PLUS®	15
CONDROTON INJETÁVEL®	16
DMSO® INJETÁVEL	18
DM-GEL®	19
ENTEREX®	20
EQUIPRAZOL®	22

FURANIL®	23
GINOVET®	24
GELO PAN®	26
GELO FLEX®	27
HIPERVIT®	28
KERAVIT®	29
MUCOMUCIL XAROPE®	30
ORNITIL®	31
PULMONIL®	32
PULMO PLUS GEL®	34
TERGENVET®	35
VETAGLÓS POMADA®	36
VETEPIN®	38

Acepran[®] 1%

Neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico.

Acepromazina é um derivado de fenotiazínico da terceira série (adrenolítica) usado frequentemente na rotina anestésica, tanto por seu efeito tranquilizante, quanto pela potencialização de agentes anestésicos barbitúricos, não barbitúricos e dissociativos. Os fenotiazínicos têm pouca atividade analgésica. A atividade principal da Acepromazina é o bloqueio dos receptores pós-sinápticos dopaminérgicos mesolímbicos no cérebro.

A deficiência de dopamina, uma catecolamina neurotransmissora, provoca sinais de dismetria, deambulação, apatia, indiferença ao meio, sonolência e decúbito lateral. Como antiemético, os fenotiazínicos inibem a zona medular disparadora do vômito.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para equinos como auxiliar no controle dos animais durante exames clínicos e diagnósticos, tratamentos, procedimentos dentários, casqueamento, ferragem, palpções abdominais e retais, embarques e transportes. Bastante eficaz quando empregado em conjunto com anestesia local em procedimentos cirúrgicos menores, tais como: castrações, neurectomias, remoção de tumores de pele, sutura de lacerações cutâneas e cirurgias oculares. Também é indicado como agente pré-anestésico, tanto por seu efeito tranquilizante, quanto pela potencialização de agentes anestésicos barbitúricos, não barbitúricos e dissociativos.

MODO DE USAR

Para ser utilizado em equinos, por via intravenosa ou intramuscular, na dose de 0,1 mg/kg, ou seja, 0,01 mL/kg.

Após administração intravenosa, os efeitos sedativos iniciam-se em 10 a 15 minutos, proporcionando 60 a 120 minutos de sedação. Quando administrado pela via intramuscular, a Acepromazina pode levar o equino a se mostrar cooperativo, orientado e tranquilo, permitindo a realização de procedimentos superficiais como, por exemplo: exame clínico de animais em estação, transporte e redução do estresse quando necessária a separação do potro da mãe.



TABELA DE TRANQUILIZAÇÃO - MPA

Fármaco	Dose mg/Kg	Via
Acepran® 1% + Meperidina 5%	0,05 Acepran® + 2 Meperidina	IM ou IV
Acepran® 1% + Xilazina 10%	0,05 Acepran® + 0,5-1 Xilazina	IV

CADA mL CONTÉM:

Acepromazina	10mg
Veículo q.s.p.	1mL

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola de 20mL.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Em provas onde exista exame antidoping, recomenda-se suspender a utilização do produto com 4 dias de antecedência.

Alantol®

NO DOPING*



Pomada cicatrizante.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alantol® é indicado para equinos como cicatrizante, na terapia de lesões cutâneas, feridas acidentais ou cirúrgicas, abscessos, escoriações de decúbito, ulcerações de superfície e queimaduras.

COMPONENTES DE DESTAQUE

Alantoína: promove debridação química de proteínas, que mantém o ferimento livre de secreções purulentas e tecidos mortos, estimulando a epitelização e proliferação celular.

Óxido de Zinco: poder adstringente, cicatrizante e secante.

MODO DE USAR

Aplicar, com as mãos ou espátula, após prévia limpeza, uma camada do produto diretamente no local afetado, espalhando suavemente sobre toda a superfície. Repetir o tratamento 1 a 3 vezes ao dia, até a cicatrização completa da lesão.

CADA 100g CONTÉM:

Alantoína	3,0g
Óxido de zinco	3,0g
Excipientes q.s.p.	100,0g

APRESENTAÇÃO

Bisnagas plásticas contendo 25g, 60g e 250g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Algivet®

DOPING*



Analgésico, espasmolítico e antipirético.

Algivet® exerce uma ação analgésica central, produz um notável efeito tranquilizador sobre os animais, sem provocar depressão sexual. Devido ao efeito espasmolítico sobre a musculatura lisa, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, resultando em uma maior afluência de sangue para a musculatura estriada, o que é fisiológica e terapeuticamente desejável. **Algivet®** não exerce nenhuma ação desfavorável sobre a circulação sanguínea, coração, rins ou qualquer outro órgão. Seu efeito é observado depois de 10-15 minutos, prolongando-se por algumas horas. Nos casos dos animais voltarem a apresentar dores e inquietude, pode-se repetir o tratamento sem inconvenientes. Nas cólicas, a ação de **Algivet®** consiste no estímulo do peristaltismo, tranquilização e espasmólise, enquanto o seu efeito analgésico representa um valioso apoio terapêutico.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para a prevenção e combate às dores das cólicas e outros estados do tipo espástico de órgãos da cavidade abdominal, artrites agudas e crônicas, estados reumáticos dos músculos e articulações. Neurites e nevralgia. Nas obstruções esôfago-faríngeas por corpos estranhos. Nos espasmos do colo uterino durante o parto; nas dilatações agudas do estômago.

MODO DE USAR

Equídeos: 20 a 40mL.

Bovinos: 8mL para cada 100kg de peso.

Potros e bezerros: 5 a 15mL.

Suínos: 10 a 30mL.

Ovelhas e cabras: 2 a 8mL.

As dosagens ao lado podem ser utilizadas por via endovenosa ou intramuscular. As vias endovenosa e intramuscular podem ser usadas concomitantemente. Quando se deseja um efeito mais rápido, é preferível a utilização da via endovenosa. As aplicações podem ser repetidas no mesmo dia, imediatamente após cessar o efeito analgésico, sem inconveniência. Não se recomenda a aplicação por via subcutânea, devido à ocorrência de eventuais irritações tissulares. Alterações na posologia a critério do médico veterinário.

CADA mL CONTÉM:

Fenildimetilpirazolona - metilaminometanosulfonato de sódio (dipirona sódica)	0,5g
Veículo q.s.p.	1,0mL

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 1 frasco-ampola com 50mL.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Em provas onde exista exame antidoping, recomenda-se suspender a utilização do produto com 5 dias de antecedência.

Ampicilina

Veterinária Injetável 2g

NO
DOPING*

Antibiótico bactericida de amplo espectro.

A Ampicilina é um composto semissintético, derivado do ácido 6-aminopenicilânico que se caracteriza por seu extenso espectro de atividade antimicrobiana. Os antibióticos β -lactâmicos exercem seus efeitos bactericidas impedindo a síntese da parede celular bacteriana e rompendo a sua integridade. Geralmente resulta na morte celular pela lise, que pode ser medida por autolisinas bacterianas.

A maioria das penicilinas em solução aquosa é rapidamente absorvida dos locais de aplicação parenteral. A Ampicilina se distribui para o fígado, a bile, o músculo, o rim e a gordura após absorção pelo sistema gastrointestinal ou a partir do local da injeção. A excreção é renal e, após 6 a 8 horas, cerca de 30% da dose administrada pode ser detectada na urina.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Ampicilina® Veterinária Injetável 2g é indicada para equinos no tratamento de infecções respiratórias, geniturinárias e gastrintestinais, além de outras localizadas ou sistêmicas causadas por *Clostridium tetani*, *Pasteurella multocida*, *Rhodococcus equi*, *Streptococcus equi* e *Streptococcus zooepidemicus*.



MODO DE USAR

Diluir o conteúdo do frasco-ampola em 10mL de água para injeção e aplicar por via intramuscular ou intravenosa.

Equinos: administrar 10mg/kg de peso corporal, 2 (duas) vezes ao dia, durante 7 dias, ou seja, 0,05mL do produto reconstituído para cada kg de peso corporal, 2 (duas) vezes ao dia, durante 7 dias.

Após a reconstituição, quando houver sobra do produto, descartar o restante.

CADA FRASCO-AMPOLA CONTÉM:

Ampicilina sódica

2,0g

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo frasco-ampola com 2g de Ampicilina sódica e ampola com 10mL de água destilada.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Ampicilina

Veterinária
Oral

NO DOPING*

Antibiótico bactericida de amplo espectro.

A Ampicilina anidra é um antibiótico bactericida que possui boa absorção pelo trato gastrointestinal. Apresenta extenso espectro de atividade bactericida contra numerosos organismos gram-positivos e gram-negativos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Em equídeos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, digestivo, além de outras localizadas ou sistêmicas causadas por: *Enterococcus* spp, *Shigella* spp, *Escherichia coli* (colibacilose), *Salmonella* spp, *Staphylococcus* spp (não produtores de penicilinase), *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Corynebacterium* spp, *Proteus* spp, *Leptospira* spp, *Pasteurella* spp, *Klebsiella* spp e *Clostridium* spp (tétano, botulismo).

Em suínos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, digestivo, além de outras localizadas ou sistêmicas causadas por: *Enterococcus* spp, *Shigella* spp, *Escherichia coli* (colibacilose), *Salmonella* spp (paratifo dos leitões), *Staphylococcus* spp (não produtores de penicilinase), *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Corynebacterium* spp, *Proteus* spp, *Leptospira* spp, *Pasteurella* spp (pasteurelose e rinite atrófica), *Klebsiella* spp, *Erysipelothrix rhusiopathiae* (erisipela), *Bordetella bronchiseptica* (rinite atrófica) e *Clostridium* spp (tétano, enterotoxemia, botulismo).

Em bovinos, ovinos e caprinos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, digestivo, além de outras localizadas ou sistêmicas causadas por: *Enterococcus* spp, *Shigella* spp, *Escherichia coli* (colibacilose), *Salmonella* spp (paratifo), *Staphylococcus* spp (não produtores de penicilinase), *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Corynebacterium* spp, *Proteus* spp, *Leptospira* spp, *Pasteurella* spp, *Klebsiella* spp, *Clostridium* spp (tétano, carbúnculo sintomático, enterotoxemia, edema maligno, botulismo) e *Fusobacterium necrophorum* (podridão dos cascos).



MODO DE USAR

Para ser utilizado por via oral.

Preparo da suspensão: adicionar água potável ao frasco, até aproximadamente metade da altura do rótulo e agitar vigorosamente até obter uma suspensão homogênea. Em seguida, completar o volume até a marca indicada no rótulo (60mL), agitando novamente.

Potros, leitões, bezerros, cordeiros e cabritos: administrar a suspensão reconstituída na dose de 10mg/kg de peso corporal, ou seja, 1mL para cada 2,5kg de peso corporal, duas a três vezes ao dia, durante 7 dias.

O produto reconstituído mantém sua atividade durante 14 dias, quando conservado sob refrigeração. Quando conservado em temperatura ambiente, o produto mantém-se estável por 7 dias. Recomenda-se a continuidade do tratamento por no mínimo 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

CADA FRASCO CONTÉM:

Ampicilina anidra.....	1,5g
Excipiente q.s.p.....	50,0g

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 50g de pó para a reconstituição.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Bionew®

NO
DOPING*



Associação de vitaminas do complexo B, nicotinamida, frutose, aminoácidos, macro e microminerais.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Bionew® é um complexo de vitaminas do complexo B, nicotinamida, frutose, aminoácidos, macro e microminerais. É indicado para grandes animais nos casos de esgotamento físico por excesso de exercícios ou produção, em quadros de intoxicações, anorexia, inapetências, convalescenças, anemias e estresse. Como coadjuvante no restabelecimento de doenças infecciosas e parasitárias. Devido à presença do selênio, potássio, vitamina B1 e do pantotenato de cálcio, **Bionew®** é um excelente reparador muscular, sendo um importante auxiliar no tratamento de miosites, mioglobinúria parolítica e outras miopatias.

MODO DE USAR

Via intramuscular ou intravenosa. Adicionar o conteúdo da ampola (Vitamina B12) ao frasco no momento do uso.

Equinos: 5mL para cada 100kg de peso corporal, até a dose máxima de 25mL em injeções intramusculares ou intravenosas lentas, preferencialmente diluídos em soro e sob supervisão do médico veterinário, com intervalo mínimo de 2 dias entre as aplicações. Em animais idosos (acima de 18 anos) deve-se realizar a aplicação somente por via intramuscular.

Bovinos adultos: 20mL em injeções intramusculares ou intravenosas lentas, a cada 24 horas, durante 3-4 dias. Bezerros: 10mL em injeções intramusculares a cada 24 horas, durante 3-4 dias.

Ovinos e caprinos: 2mL em injeções intramusculares ou intravenosas lentas, a cada 24 horas, durante 3-4 dias.

CADA 100mL CONTÉM:

Cloridrato de tiamina (Vitamina B1)	1.000mg	Aspartato de potássio	1.000mg
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6)	500mg	Aspartato de magnésio	1.000mg
Nicotinamida	2.000mg	Selenito de sódio	45mg
Pantotenato de cálcio (Vitamina B5)	400mg	Excipientes q.s.p.	100,00mL
Frutose	20g		
Cloridrato de L-arginina	2g	Cada mL contido na ampola contém:	
Acetil metionina	2g	Vitamina B12	1.500 mcg/mL

APRESENTAÇÃO

Frascos-ampola de vidro contendo 20mL e 100mL.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Condroton[®] plus

 NO
DOPING*

Regenerador articular com sulfato de condroitina A.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para equinos, muares e asininos adultos; bovinos e bubalinos adultos; potros, pôneis e bezerros; ovinos, caprinos e avestruzes adultos; cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes; suínos adultos e leitões. Indicado para auxiliar os tratamentos de artropatias não infecciosas, tais como artrites, artroses, osteoartroses, hidroartroses, artropatias degenerativas, espondiloses, espondiloses anquilosantes, condropatias, sinovites; patologias tendíneas; osteodistrofias e condrodistrofias; pós-operatório de cirurgias articulares; coadjuvante em casos de fraturas; além de atuar também na profilaxia de doenças osteoarticulares e condroproteção de animais submetidos a grandes esforços.

UTILIZAÇÕES

- Artropatias em geral;
- Patologias tendíneas;
- Pós-operatório de cirurgias articulares;
- Auxiliar para os casos de fratura;
- Prevenção de doenças osteoarticulares;
- Condroproteção para animais submetidos a grandes esforços.

MODO DE USAR

Para ser adicionado ao alimento.

ADMINISTRAÇÃO INICIAL:

Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos adultos: 10g, duas vezes ao dia. Potros,



pôneis e bezerros: 5g, duas vezes ao dia. Ovinos, caprinos e avestruzes adultos: 5g, duas vezes ao dia. Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 1g, duas vezes ao dia. Suínos adultos: 3g, duas vezes ao dia. Leitões: 0,5g, duas vezes ao dia.

MANUTENÇÃO:

Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos adultos: 10g, uma vez ao dia. Potros, pôneis e bezerros: 5g, uma vez ao dia. Avestruzes adultos: 5g, uma vez ao dia. Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 1g, duas vezes ao dia. Suínos adultos: 3g, uma vez ao dia. Leitões: 0,5g, uma vez ao dia.

CADA 100g CONTÉM:

Sulfato de condroitina A	19,0g
Glucosamina	55,0g
Moluscos (<i>Perna canaliculus</i>)	15,0g
Colágeno	6,0g
Sulfato de manganês	0,68g
Veículo q.s.p.	100,0g

APRESENTAÇÃO

Potes plásticos contendo 500g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Condroton[®]

Injetável

NO
DOPING*

Regenerador articular com sulfato de condroitina A.

O sulfato de condroitina e a glucosamina têm um tropismo para os tecidos articulares e cartilagueos, onde se ligam seletivamente à cartilagem degradada ou lesada, iniciando o processo de regeneração deste tecido. O uso dos glicosaminoglicanos objetiva a reposição do que foi perdido durante processos patológicos (condrorreparação) e do que se perde na atividade normal do animal (condroproteção).

Outra importante propriedade é o efeito anti-inflamatório, notado após a utilização desses compostos. Os glicosaminoglicanos também inibem a ação de enzimas lisossomais (liberadas por leucócitos no fluido sinovial), induzem a produção de hialuronato de sódio e estimulam a síntese de colágeno.

Outros efeitos fisiológicos do sulfato de condroitina são: contribuição à ossificação e calcificação dos ossos, além da manutenção da elasticidade de tendões e ligamentos.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Indicado para equídeos, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e aves para auxiliar nos tratamentos de artropatias não infecciosas, tais como: artrites, artroses, osteoartroses, hidroartroses, artropatias degenerativas, displasias coxofemorais, espondiloses, espondiloses anquilosantes, condropatias, sinovites; patologias tendíneas, osteodistrofias e condrodistrofias, pós-operatório de cirurgias articulares; coadjuvante em casos de fraturas, além de atuar também na profilaxia de doenças osteoarticulares e condroproteção de animais submetidos a grandes esforços.

UTILIZAÇÕES

- Artropatias em geral;
- Patologias tendíneas;
- Pós-operatório de cirurgias articulares;
- Auxiliar para os casos de fratura;
- Prevenção de doenças osteoarticulares;
- Condroproteção para animais submetidos a grandes esforços.

MODO DE USAR

Uso injetável via intramuscular ou subcutânea.

Equídeos, bovinos e bubalinos: aplicar 2mL para cada 100kg de peso corporal, até a dose máxima de 10mL, a cada 5 ou 7 dias, num mínimo de 5 aplicações.

Ovinos, caprinos, suínos e aves: aplicar 0,5mL para cada 10kg de peso corporal, até a dose máxima de 5mL, a cada 5 ou 7 dias, num mínimo de 5 aplicações.



CADA 100mL DO PRODUTO CONTÉM:

Sulfato de condroitina "A"	7,5g
Sulfato de glucosamina	7,5g
Veículo q.s.p.	100mL

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 10mL.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional).
Porém, consultar o regulamento específico da prova.



DMSO[®]

Injetável

DOPING*



Ação anti-inflamatória e analgésica.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

DMSO[®] Injetável é um anti-inflamatório indicado para dor e edema em tecidos musculoesqueléticos e viscerais. O mecanismo de ação anti-inflamatória decorre em grande parte pela remoção de radicais livres, o que promove proteção e diminuição dos danos teciduais, com consequente redução do edema. Já a ação analgésica ocorre diretamente pelo bloqueio químico nas fibras dos nervos aferentes e ação central e indiretamente pela própria ação anti-inflamatória por ele exercida.

MODO DE USAR

Deve ser aplicado lentamente por via intravenosa, diluído em solução a 10% (Fisiológica ou Ringer Lactato).

Equinos: 1g/Kg, uma a duas vezes ao dia, durante 2 a 5 dias, ou seja, diluir 100mL de DMSO[®] Injetável em 900mL de Solução Fisiológica 0,9% ou de Ringer Lactato para cada 100Kg de peso.



CADA 100g CONTÉM:

Dimetilsulfóxido	99,0g
Veículo q.s.p.	100mL

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 100mL e 500mL.

1º DMSO
Intravenoso
do Mercado

✓ Seguro
✓ Eficaz

*Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



DM-Gel[®]

DOPING*

Potente anti-inflamatório e antiedematoso tópico.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Inflamações articulares, musculares, ligamentosas, tendinites, artrites, artroses, bursites, miosites, hematomas, edemas e traumatismos diversos, em contusões, luxações, distensões e lesões decorrentes de práticas desportivas.

COMPONENTES DE DESTAQUE

Escina: antiedematoso com leve ação sobre o tônus do músculo liso da parede venosa, diminuindo a hiperpermeabilidade vascular.

Prednisolona e dexametasona: corticoides com potente atividade anti-inflamatória, através de inibição de fosfolipase A₂, inibindo, consequentemente, o ácido araquidônico.

Lidocaína: potente anestésico tópico.

DMSO (dimetilsulfóxido):

- Alto poder de penetração nos tecidos, principalmente o cutâneo;
- Propriedade de carrear substâncias;
- Apresenta efeitos anti-inflamatórios;
- Suas ações farmacológicas são descritas por penetração e transporte através de membranas (vasodilatação), aumentando a eficácia de outras drogas associadas ao tratamento, além de bacteriostase, analgesia com relaxamento muscular, diurese, inibição da colinesterase e potente ação anti-inflamatória. (Jacob et al, 2004).



MODO DE USAR

Aplicar sobre o local afetado uma camada do produto massageando levemente. Deixar uma película fina protegendo a região.

CADA 100g CONTÉM:

Dimetilsulfóxido	61,34mL
Solução de escina 20%	11,12mL
Dexametasona	0,11g
Prednisolona	0,28g
Lidocaína (cloridrato)	1,00g
Excipientes q.s.p.	100,00g

APRESENTAÇÃO

Pote contendo 300g.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Em provas onde exista exame antidoping, recomenda-se suspender a utilização do produto com 7 dias de antecedência.

Enterex[®]

NO
DOPING*

Adsorvente de toxinas e venenos presentes
no trato gastrointestinal.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Enterex[®] está indicado como adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato gastrointestinal de equídeos, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, cães e gatos, nos casos de envenenamentos, intoxicações diversas e auxiliar em diarreias e gastroenterites.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral, adicionado aos alimentos ou diluído em água. Para uso diluído em água, cada sachê deverá ser diluído em 40mL e administrado através de seringa ou sonda nasogástrica.

Em casos de diarreias e gastroenterites:

- Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos: 80mL para cada 100kg de peso vivo, a cada 8 a 12 horas;
- Equídeos, bovinos e bubalinos adultos: 200mL para cada 500kg de peso vivo, a cada 8 a 12 horas.

Em casos de envenenamentos e intoxicações:

- Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos: 160mL para cada 100kg de peso vivo, a cada 4 a 6 horas até a melhora dos sintomas;
- Equídeos, bovinos e bubalinos adultos: 400mL para cada 500kg de peso vivo, a cada 4 a 6 horas até a melhora dos sintomas.



OBSERVAÇÕES

- 1 - Mais efetivo quando administrado rapidamente no envenenamento agudo, dentro de 30 minutos após a ingestão do veneno.
- 2 - Em animais de estômago simples, a suspensão pode ser utilizada para lavagem gástrica.

CADA 100g CONTÉM:

Carvão ativado	40g
Zeolita	40g
Caolim	10g
Pectina	10g

APRESENTAÇÃO

Caixas display contendo 10 sachês de 8g cada.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Equiprazol[®]

Omeprazol 20%

NO
DOPING*



Inibidor da secreção ácido gástrica.

O princípio ativo do **Equiprazol[®]** (Omeprazol) é um inibidor da secreção ácido gástrica, cujo mecanismo de ação envolve a inibição específica potente da bomba de prótons.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

O **Equiprazol[®]** é um medicamento indicado para a prevenção e o tratamento de úlceras gástricas e duodenais em cavalos e potros.

DIFERENCIAIS

- **Eficácia comprovada:** “avaliação da eficácia do **Equiprazol[®]** em cavalos PSI com úlceras gástricas (PAGANELA et. al., 2016)”;
- **Concentração de 20%:** dose de apenas 10g/dia;
- **Rendimento do pote:** 30 dias;
- **Apresentação em pellets:** melhor custo-benefício.

CADA 100g CONTÉM:

Omeprazol.....	20,0g
Veículo q.s.p.....	100g

MODO DE USAR

Para uso em equinos por via oral:

- **Animais adultos:** administrar uma medida de 10g.
- **Potros:** administrar uma medida de 5g.

Em ambos os casos, administrar o medicamento uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã, por um período de 30 dias.

Observação: cada medida de 10g contém 2g de Omeprazol.

Para aplicação, recomenda-se a utilização de uma seringa cortada (10 a 20mL) adicionada com algum líquido palatável.

APRESENTAÇÃO

Pote contendo 300g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Furanil®

NO
DOPING*



Antimicrobiano com clorexidina.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Furanil® solução e Furanil® pomada

Indicado para equinos na profilaxia e tratamento das infecções bacterianas e fúngicas da pele e mucosas, órgãos genitais, piodermite, foliculites, pododermatites e micoses. Também está indicado para a assepsia de feridas, cortes, escoriações, abscessos, fístulas e ulcerações de decúbito.

MODO DE USAR

Fazer a assepsia das regiões afetadas com a utilização do **Furanil®** solução ou **Furanil®** pomada, deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. Repetir a aplicação do produto, deixando uma camada recobrindo o local. As regiões afetadas podem ser recobertas com gaze ou outros curativos. Repetir o tratamento diariamente até a cura. A frequência de aplicação e as dosagens poderão ser alteradas de acordo com a orientação do médico veterinário.

CADA 100mL/g CONTÉM:

Clorexidina (digluconato).....	0,7g
Excipiente q.s.p.....	100mL/g

APRESENTAÇÃO

Bisnaga pomada de 50g, pote pomada de 500g, frasco solução de 500mL e frasco solução spray de 60mL.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Ginovet®

NO
DOPING*

Tabletes efervescentes.

Ginovet® - tabletes efervescentes que tratam e/ou previnem a infecção uterina, ao mesmo tempo em que favorece a expulsão da placenta. A ação antimicrobiana do cloridrato de tetraciclina é ampla, combatendo muitos micro-organismos aeróbicos, gram-positivo e gram-negativo.

O excipiente efervescente de **Ginovet®** permite rápida desintegração do tablete e difusão do princípio ativo por toda a cavidade uterina, auxiliando na limpeza do conteúdo purulento, favorecendo uma ação mais efetiva do agente antimicrobiano.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Ginovet® tabletes efervescentes é indicado no combate aos principais agentes causadores das endometrites e vaginites em:

Éguas: causados por *Streptococcus zoopidermicus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Corynebacterium equi*, *Haemophilus equigenitalis*.

Porcas: causados por *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus* spp, *E. coli*, *Klebsiella* spp e espécies de *Mycoplasma* spp.

Vacas: causados por *Streptococcus* spp, *Corynebacterium* spp, *E. coli*, *Actinomyces pyogenes*, *Klebsiella* spp, *Fusobacterium necrophorum*, algumas espécies de *Proteus* e *Pseudomonas*.

Ovelhas: causados principalmente por *Campylobacter* spp.

Também é indicado como agente preventivo de infecções do endométrio na retenção de placenta; após cesarianas; nos partos distócicos ou quando houver auxílio obstétrico; nas fetotomias e nos partos normais quando as condições de higiene forem deficientes.



MODO DE USAR

Éguas e vacas:

Tratamento:

- Endometrites: introduzir na cavidade uterina 2 tabletes por dia até a cura completa.
- Vaginites: 1 tablete por dia até a remissão do processo.

Controle:

- Na retenção de placenta: após 12 horas, 2 a 3 tabletes distribuídos pela cavidade uterina, entre endométrio e as secundinas. Se necessário, repetir no 3º, 6º e 9º dia.
- Após o parto ou fetotomia: introduzir no útero 1 a 2 tabletes.

Porcas e ovelhas:

Tratamento:

- Endometrites: introduzir na cavidade uterina 1 tablete por dia até a cura completa.
- Vaginites: 1 tablete por dia até a remissão do processo.

Controle:

- Na retenção de placenta: após 12 horas, 1 tablete na cavidade uterina, entre o endométrio e as secundinas. Se necessário, repetir no 3º, 6º e 9º dia.
- Após o parto ou fetotomia: introduzir no útero 1 tablete.

Qualquer alteração na posologia e modo de usar fica a critério do médico veterinário.

CADA TABLETE DE 7g CONTÉM:

Tetraciclina (cloridrato).....	1,0g
Excipiente efervescente q.s.p.....	7,0g

APRESENTAÇÃO

Cartuchos contendo 48 tabletes, acompanhados de luvas plásticas.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Gelo Pan®

DOPING*



Relaxante muscular em gel.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para equinos e bovinos nas fadigas de músculos, tendões, articulações e ligamentos, em traumas, contusões, luxações, artrites, reumatismos e dores musculares advindas de práticas desportivas.

MODO DE USAR

Gelo Pan® vem pronto para uso. Aplicar no local afetado massageando a favor do pelo. Diluído em água morna: 50g do produto para 1 litro de água. Massagear a região afetada.

CADA 100g CONTÉM:

Mentol	1,0g
Cânfora	1,0g
Salicilato de metila	1,0g
Excipientes q.s.p.	100,0g

APRESENTAÇÃO

Bisnagas plásticas contendo 100g e potes plásticos contendo 450g.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Em provas onde exista exame antidoping, recomenda-se suspender a utilização do produto com 7 dias de antecedência.



Gelo Flex®

NO
DOPING*

Pasta a frio tópica para equinos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Gelo Flex® é uma pasta a frio recomendada para massagem e como auxiliar no relaxamento de músculos e tendões de equinos. Promove resfriamento destes tecidos através dos agentes térmicos mentol e cânfora. Seu uso é indicado após práticas esportivas ou trabalhos intensos.

MODO DE USAR

Aplicar com espátula uma camada do produto sobre a região desejada, deixando uma película de 5mm de espessura. Para retirar a pasta, basta aplicar uma ducha de água.

CADA 100g CONTÉM:

Salicilato de metila	0,15g
Cânfora	0,15g
Mentol	0,15g
Eucalipto	0,15g
Glicerina	0,74g
Excipientes q.s.p.	100,00g

APRESENTAÇÃO

Potes plásticos contendo 1, 2kg e 6kg.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Hipervit[®]

NO
DOPING*



Vitamina B12 injetável em alta concentração.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Como fator hematopoiético nas anemias macrocíticas. Tratamento das nevralgias e algias em geral. Perturbações neuromusculares inespecíficas. Anorexia e polineurites. Estados carenciais (dermatoses e queda de pelo). Nas premunições e casos de tristeza bovina. Na recuperação de animais jovens com atraso de crescimento. Nos processos de fadiga muscular (especialmente após grandes esforços).

MODO DE USAR

Via intravenosa.

Bovinos e equinos adultos: 5mL.

Animais de médio porte: 2 a 3mL.

Obs.: as doses são diárias, ficando a duração do tratamento a critério do médico veterinário, na dependência da gravidade dos processos.

CADA AMPOLA CONTÉM:

Cianocobalamina	20.000mcg
Veículo q.s.p.	5,0mL

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 5 ampolas de 5mL cada uma.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Keravit®

NO
DOPING*

Pomada oftálmica antibiótica e anti-inflamatória.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Nas infecções oculares bacterianas com irritação, inflamação ou edema. Nas afecções oculares inflamatórias e alérgicas dos animais.

A gentamicina é ativa contra *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, espécies de *Proteus* indol-positivas e indol-negativas, *Pseudomonas aeruginosa*, algumas espécies de *Serratia* não pigmentada e muitas espécies de *Salmonella* e *Shigella*.

MODO DE USAR

Aplicar em camada fina, sobre a borda palpebral, 3 a 4 vezes ao dia. Depois de obtida resposta satisfatória, reduzir gradativamente o número de aplicações diárias.

Se necessário, realizar prévia limpeza do globo ocular, retirando as secreções que porventura existirem. A fórmula especial de **Keravit®** permite manter sobre o globo ocular e bordas palpebrais uma camada uniforme de medicamento que não é diluída e nem arrastada pela secreção lacrimal, o que assegura a ação permanente dos princípios ativos.

Manter o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

CADA 100g CONTÉM:

Gentamicina (sulfato)	0,3g
Hidrocortisona	1,0g
Vitamina A	500.000UI
Vitamina D	62.500UI
Excipiente q.s.p.	100,0g

APRESENTAÇÃO

Bisnaga de 5g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Mucomucil® *xarope*

NO
DOPING*



Mucolítico.

Mucomucil® fluidifica as secreções e favorece a expectoração. A N-Acetilcisteína, devido à sua capacidade em mudar qualitativamente e quantitativamente as características das secreções, influencia substancialmente a evolução e resolução das broncopneumopatias, reduzindo os riscos de complicações decorrentes da retenção de secreção e consequente insuficiência na aeração dos pulmões. A atividade de "varredor de oxidantes" é exercida tanto diretamente como indiretamente, através da manutenção e/ou incremento dos níveis da glutathione, da qual a N-Acetilcisteína é precursora.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para equídeos. **Mucomucil® Xarope** é um mucolítico indicado para animais que apresentem patologias respiratórias caracterizadas pela presença de secreções mucoides e mucopurulentas (catarro), tais como broncopneumonia, bronquite (aguda, subaguda e crônica), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), influenza, garrotilho, atelectasia por obstrução mucosa, entre outras. Também é indicado como coadjuvante nas terapias antibióticas das afecções pulmonares.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equinos, muare e asininos: dose básica de N-Acetilcisteína: 10mg/kg de peso corporal, duas vezes ao dia. Esta dosagem pode ser representada em 0,05mL/kg de peso corporal, duas vezes ao dia. A duração do tratamento depende dos fatores relacionados à patologia, podendo variar de 5 a 15 dias. As dosagens poderão ser alteradas de acordo com a orientação do médico veterinário.

Obs.: Cada medida dosadora das apresentações de 500mL contém 4,0mL.

CADA 100mL CONTÉM:

N-Acetilcisteína	20g
Veículo q.s.p	100mL

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 500mL.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Ornitil®

NO
DOPING*

Auxiliar do metabolismo hepático.

Ornitil® ajuda a transformar produtos tóxicos, decorrentes da metabolização de proteínas, em substâncias menos tóxicas, passíveis de serem excretadas ou reaproveitadas. O principal metabólito produzido por estas reações é a amônia, que deve ser transformada em ureia, pelo ciclo da ureia ou de Krebs-Henseleit. Durante o ciclo, a participação da ornitina, citrulina e arginina são fundamentais para a transformação da amônia e eliminação da ureia.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Ornitil® é indicado para equinos como auxiliar do metabolismo hepático e tratamento dos estados carenciais dos ingredientes que compõem a fórmula do produto.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Eficiente antitóxico e auxiliar no metabolismo hepático;
- Princípios ativos considerados fundamentais para conversão de subprodutos tóxicos decorrentes da metabolização de proteínas.

UTILIZAÇÕES

- Atua como antitóxico;
- Auxiliar do metabolismo hepático (protetor hepático);
- Coadjuvante no tratamento em intoxicações exógenas;
- Em tratamentos hiperproteicos e hiperamoniemia (doença metabólica);
- Em intoxicações não infecciosas;
- Em perturbações funcionais hepáticas causadas por alimentos deteriorados;
- Na prática de exercícios físicos e também como energético.

MODO DE USAR

Deve ser utilizado por via intravenosa em equinos, uma vez ao dia, durante 4 a 7 dias.

Equinos: 10 a 30 mL para cada 100 kg de peso corporal.

CADA 100mL CONTÉM:

Aspartato de L-Ornitina	2,0g	Acetil metionina	1,0g
Cloridrato de L-Arginina	7,5g	Citrato de Colina	1,0g
L-Citrulina	0,5g	Veículo q.s.p.	100mL

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 100mL.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Pulmonil[®]

DOPING*



Espasmolítico bronquial e broncodilatador para equinos.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Devido à sua capacidade broncodilatadora e espasmolítica, é indicado no tratamento das enfermidades respiratórias caracterizadas por espasmos bronquiais. Também é coadjuvante no tratamento de enfermidades respiratórias, tais como pneumonias, bronquites e profilaxia de reações alérgicas causadas por agentes alérgenos ambientais (poeira do feno ou serragem). Ensaios clínicos demonstraram notável melhora em casos de hemorragias pulmonares.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

A duração do tratamento depende fundamentalmente dos fatores relacionados à enfermidade, etiologia, estado geral do animal, quadro que somente o médico veterinário poderá avaliar.

Para orientação baseada em ensaios clínicos, recomendamos para os estados agudos um tratamento de até 2 semanas e para os estados crônicos de até 4 semanas. Nos equinos hipersensíveis a agentes ambientais, recomenda-se o uso de **Pulmonil[®]** cada vez que o animal apresentar episódios alérgicos.

MODO DE USAR

Para equinos por via oral.

Pulmonil[®] Gel

Dose básica: 0,8mcg/kg de peso, duas vezes ao dia – o que representa 5mL de Pulmonil[®] Gel para 125kg de peso, duas vezes ao dia. Uma medida dosadora contém 4mL de Pulmonil[®] Gel.

Pulmonil[®] Pó

Dose básica: 0,8mcg/kg de peso corporal duas vezes ao dia – o que representa 5g de Pulmonil[®] Pó oral para 125kg de peso corporal, duas vezes ao dia. Contém uma medida dosadora.

CADA 100mL/g CONTÉM:

Clenbuterol (Cloridrato)	2,0mg
Veículo q.s.p	100mL/g

APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos contendo 500mL e 500g.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Pulmo Plus[®] Gel

DOPING*



Broncoespasmolítico e mucolítico.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Pulmo Plus[®] é uma combinação de um broncodilatador e um mucolítico indicado para equinos que apresentem patologias respiratórias caracterizadas por broncoespasmo, presença de secreções e catarro, tais como broncopneumonia, bronquites (aguda, subaguda e crônica), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), atelectasia por obstrução mucosa, entre outras. Também é indicado na profilaxia de reações alérgicas em animais sensíveis e como coadjuvantes nas terapias antibióticas das afecções pulmonares.

MODO DE USAR

Para equinos por via oral.

Equinos, muares e asininos:

Dose básica de clenbuterol: 0,8mcg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia; dose básica de N-Acetilcisteína: 5-10mg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia.

Esta dosagem pode ser representada em 4mL de **Pulmo Plus[®] Gel** para 100kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia. Cada medida dosadora contém 4mL de **Pulmo Plus[®] Gel**, ou seja, cada vez que a válvula dosadora é pressionada, são liberados 4mL do produto. No início do tratamento ou retorno dele, é indicado fazer a adaptação do animal ao produto, usando metade da dose nas quatro primeiras aplicações, aumentando gradativamente até a dose total.

A duração do tratamento depende dos fatores relacionados à patologia. Em casos agudos e subagudos, recomendamos uso durante 10 a 14 dias. Nos casos crônicos, o tratamento pode se estender por até 4 semanas. As dosagens poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com a orientação do médico veterinário.

CADA 100mL CONTÉM:

Clenbuterol (cloridrato)	2,0mg
N-Acetilcisteína	20,0g
Veículo q.s.p	100,0mL

APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos contendo 500mL.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Tergenvet®

NO
DOPING*



Solução para limpeza de ferimentos e fluidificação de secreções mucopurulentas.

Tergenvet® tem como propriedade principal a capacidade de reduzir a tensão superficial ou interfacial de um meio em relação a outro, facilitando a miscigenação entre eles. Por esta razão, fluidifica as secreções espessas, removendo para o meio líquido as aderências e tecidos necrosados, o que favorece sua eliminação. Devido à sua capacidade tensoativa, favorece a penetração de outros compostos nos tecidos, auxiliando a antisepsia e, conseqüentemente, a melhora do quadro clínico.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Indicado para a limpeza de ferimentos, dermatites, abscessos, flegmões e outras lesões.

MODO DE USAR

Uso tópico: nos casos de dermatites, feridas, abscessos e flegmões, aplicar o produto no local afetado e remover as crostas e secreções indesejáveis. Repetir a aplicação caso necessário. O produto também pode ser usado, semanalmente, no conduto auditivo para limpeza de rotina.

CADA 1mL CONTÉM:

Lauril dietileno glicol éter sulfato de sódio (28%)	1,25mg
Veículo q.s.p.	1,00mL

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 250mL e spray de 125mL.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Vetaglós[®]

Pomada



Anti-infecciosa, epitelizante e cicatrizante.

A fórmula de **Vetaglós[®] Pomada** contém agentes antimicrobianos altamente eficazes no combate aos diversos micro-organismos que podem estar presentes nas infecções dermatológicas. A gentamicina é ativa contra *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, espécies de *Proteus* indol-positivas e indol-negativas, *Pseudomonas aeruginosa*, algumas espécies de *Serratia* não pigmentadas e muitas espécies de *Salmonella* e *Shigella*. A sulfanilamida e sulfadiazina são ativas contra espécies de *Streptococcus*, *Proteus*, *Pasteurella* e *Salmonella*, além do *Staphylococcus aureus* e *E. coli*. Também têm alta eficácia contra *Clostridium perfringens* e contra gêneros *Bacteroides* e *Fusobacterium*. A atividade antibacteriana das sulfas é aumentada pela ureia presente na fórmula de **Vetaglós[®] Pomada**.

Vetaglós[®] Pomada possui também em sua fórmula a vitamina A que tem extraordinária ação sobre o epitélio, auxiliando na manutenção e regeneração do mesmo.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

- Nos ferimentos superficiais de pele ou de difícil cicatrização;
- Nos ferimentos infectados das regiões de articulações muito móveis;
- Nas feridas e pisaduras infectadas, provocadas por selas e arreios;
- Nas feridas ou escaras de decúbito infectadas, perdas epiteliais, lesões de escoriações, de coceiras do casco e da pele;
- Nas úlceras infectadas e purulentas, furúnculos e abscessos;
- Nas queimaduras e erupções vesiculosas e varioliformes;
- Nas dermatites (inflamação da pele) e rachaduras da pele;
- Na proteção das feridas cirúrgicas.



MODO DE USAR

Aplicar uma fina camada, 1 a 2 vezes ao dia, após prévia limpeza das áreas afetadas. O tratamento deverá ter continuidade por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

CADA 100g CONTÉM:

Gentamicina (sulfato)	0,5g
Sulfanilamida	5,0g
Sulfadiazina	5,0g
Ureia	5,0g
Palmitato de Vitamina A	120.000UI
Excipiente q.s.p.	100,0g

**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

APRESENTAÇÃO

Bisnagas contendo 20g e 50g.



Vetepin®

DOPING*

Auxílio no tratamento da dor crônica - Neurolítico.

Vetepin® é um neurolítico que promove o bloqueio temporário, seletivo e imediato em fibras nervosas não mielinizadas do tipo C, sem danificar as fibras nervosas mielinizadas do tipo A, não causando assim prejuízo nas fibras motoras ou sensitivas.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para equídeos no bloqueio reversível das fibras nervosas do tipo C, suprimindo a dor crônica e auxiliando no tratamento de distúrbios do sistema locomotor tais como:

- Neuralgia;
- Mialgia;
- Miosite;
- Contratura muscular;
- Doença articular degenerativa;
- Bursite;
- Sinovite;
- Periostite;
- Osteíte de falange distal.

MODO DE USAR

Para ser usado por via perineural.

Dosagem: varia de acordo com o local a ser tratado.

- Nervos digitais: 2 a 4mL;
- Nervos palmares e plantares: 3 a 5mL;
- Nervo peroneal superficial: 3mL;
- Nervo peroneal profundo: 5 a 7mL;
- Nervo tibial: 5 a 7mL;
- Periostites metacarpianas / metatarsianas e/ou osteítes intermetacarpiana / intermetatarsiana: 5mL.


A frequência de aplicação e as dosagens poderão ser alteradas de acordo com a orientação do médico veterinário.

CADA 100mL CONTÉM

Cloreto de amônio (mín.).....	2g
Veículo q.s.p.....	100mL



MECANISMO DE AÇÃO



APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 50mL.



**Substância presente na lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*



SUPLEMENTOS | LINHA EQUINOS

AMINOMIX® FORTE.....	42
AMINOMIX® HARAS.....	44
BIO HOOF®.....	45
CALM-NEW 5.000®.....	46
CAL-D-MIX® LÍQUIDO.....	48
CREATINA®.....	49
ELETROLÍTICO BOOSTER® / ELETROLÍTICO®.....	50

E-S-E®.....	52
GLICOPAN ENERGY®.....	53
HEPVET EQUINOS®.....	54
HEMOLITAN®.....	56
ORGANEW®.....	57
ORGANEW® PASTA.....	58
PROMATER®.....	60
PROBIÓTICO EQUINOS®.....	62
VITA-VET C®.....	63

Aminomix[®]

Forte



Suplemento vitamínico mineral aminoácido para alimentação animal.

Suplemento com nutrientes essenciais à alimentação do cavalo atleta. Reúne em sua formulação macro e microminerais, vitaminas, leveduras, além de aminoácidos essenciais e de importância, proporcionando a transformação e utilização dos alimentos para o desempenho das funções atléticas dos cavalos de alta performance. Auxilia no desenvolvimento da criação de equinos, avestruzes e suínos.

Aminomix[®] Forte fornece diariamente as doses essenciais para a construção e manutenção de estruturas orgânicas do animal, de forma que na criação seja atingido o máximo do potencial genético. Os ingredientes prontamente assimiláveis em sua fórmula propiciam uma melhora do estado geral dos animais.

Aminomix[®] Forte contém ferro, cobre e zinco quelatados, o que melhora o aproveitamento dos mesmos e assegura a absorção das vitaminas pela não formação de complexos insolúveis.

Aminomix[®] Forte também contém leveduras vivas (*Saccharomyces cerevisiae*) e enzimas, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, uma melhor conversão alimentar.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplementação de aminoácidos, vitaminas, macro e microminerais para alimentação de equinos, muas, asininos, avestruzes e suínos. Contém os nutrientes essenciais à alimentação dos animais. Reúne em sua formulação macro e microminerais, vitaminas e aminoácidos, sendo indicado para animais em crescimento, ganho de massa corporal, estímulo do apetite e preparo

para competições e exposições. Contém ainda leveduras vivas (probiótico), que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, uma melhor conversão alimentar.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Vitamina A (Min.)	2.000.000UI	Lisina (Min.)	23,22g
Vitamina B1 (Min.)	250mg	Metionina (Min.)	21,57g
Vitamina B12 (Min.)	1.000mcg	Prolina (Min.)	9.426mg
Vitamina B2 (Min.)	200mg	Serina (Min.)	971mg
Vitamina B6 (Min.)	200mg	Tirosina (Min.)	541mg
Vitamina C (Min.)	5.000mg	Treonina (Min.)	542mg
Vitamina D3 (Min.)	150.000UI	Triptofano (Min.)	416mg
Vitamina E (Min.)	1.000UI	Valina (Min.)	1.957mg
Biotina (Min.)	50mg	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 ⁹ UFC
Ácido nicotínico (Min.)	600mg	Cálcio (Máx.)	199,5g
Ácido fólico (Min.)	200mg	(Min.)	180,5g
Pantotenato de cálcio (Min.)	500mg	Fósforo (Min.)	104g
Colina (Min.)	4.850mg	Iodo (Min.)	144mg
Ácido aspártico (Min.)	508mg	Ferro (Min.)	2.000mg
Ácido glutâmico (Min.)	2.925mg	Sódio (Min.)	2.919mg
Alanina (Min.)	7.120mg	Cobre (Min.)	600mg
Arginina (Min.)	4.010mg	Cromo (Min.)	80mg
Cisteína (Min.)	224mg	Enxofre (Min.)	8.000mg
Fenilalanina (Min.)	1.626mg	Cobalto (Min.)	200mg
Glicina (Min.)	12,69g	Selênio (Min.)	60mg
Histidina (Min.)	348mg	Magnésio (Min.)	33g
Isoleucina (Min.)	1.378mg	Manganês (Min.)	427mg
L-Carnitina (Min.)	10g	Zinco (Min.)	3.000mg
Leucina (Min.)	2.801mg		



MODO DE USAR

Para ser adicionado ao alimento.

Equínos, muare e asinínos adultos:

- Manutenção: 40g/dia;
- Treinamento leve: 60g/dia;
- Treinamento moderado: 80g/dia;
- Treinamento intenso: 100g/dia.

Potros e pôneis: 30g/dia.

Avestruz adulto: 20g/dia.

Avestruz filhote: 5g/dia.

Suínos adultos: 15g/dia.

Leitões: 5g/dia.

APRESENTAÇÃO

Baldes contendo 2,5kg, 5kg e 20kg e saco contendo 25kg.

**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*



Aminomix[®]

NO DOPING*

haras

Suplemento vitamínico mineral aminoácido para equinos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplementação de aminoácidos, vitaminas, macro e microminerais para equídeos.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equídeos (equinos, muares, asininos): incorporar à ração na proporção de 3 a 4%, ou seja, de 3 a 4kg para cada 100kg de ração.

APRESENTAÇÃO

Saco contendo 25kg.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Vitamina A (Min.).....	500.000UI	Tirosina (Min.)	1.000mg
Vitamina B1 (Min.).....	145mg	Fenilalanina (Min.).....	1.800mg
Vitamina B12 (Min.).....	800mcg	Ferro (Min.).....	1.350mg
Vitamina B2 (Min.).....	150mg	Cobalto (Min.)	120mg
Vitamina B6 (Min.).....	58mg	Cobre (Min.).....	1.732mg
Vitamina C (Min.).....	150mg	Zinco (Min.).....	2.552mg
Vitamina D3 (Min.)	100.000UI	Manganês (Min.).....	428mg
Vitamina E (Min.)	600UI	Selênio (Min.).....	6mg
Biotina (Min.)	12mg	Sódio (Min.).....	1.700mg
Pantotenato de cálcio (Min.)	400mg	Magnésio (Min.)	45,8g
Ácido fólico (Min.).....	60mg	Iodo (Min.)	125mg
Ácido aspártico (Min.).....	1.400mg	Enxofre (Min.).....	14,5g
Ácido glutâmico (Min.).....	3.600mg	Cálcio (Máx.).....	244g
Ácido nicotínico (Min.).....	600mg	(Min.).....	222g
Lisina (Min.).....	16,1g	Fósforo (Min.).....	46,1g
Metionina (Min.).....	11,7g		
Colina (Min.).....	4.868mg		
Arginina (Min.).....	3.800mg		
Glicina (Min.)	10,6g		
Triptofano (Min.).....	182mg		
Histidina (Min.).....	1.000mg		
Treonina (Min.).....	800mg		
Serina (Min.).....	1.300mg		
Prolina (Min.)	7.500mg		
Alanina (Min.)	6.000mg		
Cisteína (Min.)	89,7mg		
Valina (Min.)	1.800mg		
Isoleucina (Min.)	1.100mg		
Leucina (Min.).....	3.000mg		



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Bio Hoof®

NO DOPING*

Biotina e zinco quelatados para os cascos, pelo, crina e cauda.

Mundialmente comprovada, a composição de biotina, lisina e metionina promove o crescimento e desenvolvimento normais dos cascos. Os elementos zinco e enxofre carregam estas vitaminas e aminoácidos até o epitélio do casco, propiciando o estímulo do crescimento, mantendo as características morfológicas, plásticas e funcionais ideais dos cascos e pelos dos animais. Além de lisina e metionina, **Bio Hoof®** contém biotina e zinco quelatado com características de tropismo para regiões com presença de queratina.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Bio Hoof®: suplemento em pó, contendo elementos para auxiliar o crescimento e regeneração dos cascos, pelagem, cauda e crina dos animais.

Bio Hoof® Liquid: suplemento líquido, contendo biotina, metionina, lisina e zinco, elementos estes que atuam no crescimento e manutenção da integridade dos cascos, pelagem, cauda e crina dos animais.

MODO DE USAR

Bio Hoof®:

Para ser adicionado ao alimento.

- Equinos, muare e asininos adultos: 10g/dia;
- Potros e pôneis: 5g/dia;
- Avestruzes adultos: 5g/dia;
- Avestruzes filhotes: 1g/dia;
- Suínos adultos: 3g/dia;
- Leitoões: 0,5g/dia.

Bio Hoof® Liquid:

Para ser usado por via oral.

- Equinos, muare e asininos adultos: 10mL/dia;
- Potros e pôneis: 5mL/dia;
- Avestruzes adultos: 5mL/dia;
- Avestruzes filhotes: 1mL/dia;
- Suínos adultos: 3mL/dia;
- Leitoões: 0,5mL/dia.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

BIO HOOF®

Biotina (Min.)	2.500mg
DL-Metionina (Min.)	120g
Ácido fólico (Min.)	2.400mg
Zinco (Min.)	5.000mg
Enxofre (Min.)	20g
L-Lisina (Min.)	180g
Vitamina B2 (Min.)	2.400mg

BIO HOOF® LIQUID

Biotina (Min.)	2.500mg
DL-Metionina (Min.)	25g
Zinco (Min.)	12,75g
L-Lisina (Min.)	50g

APRESENTAÇÃO

Bio Hoof®: Pote de 500g com medida dosadora.

Bio Hoof® Liquid: Frasco de 1L com dosador.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Calm-new[®] 5.000

NO
DOPING*

Auxilia o manejo nas situações de estresse.

Calm-new® 5000 contém elementos importantes para a manutenção do bem-estar de animais submetidos a situações de estresse, não afetando a performance dos animais em competições ou exposições.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para auxiliar no manejo de animais arreados ou que sofrem constantemente de estresse. Especialmente formulado à base de triptofano puro, magnésio e vitamina B1, favorece a ação da serotonina diretamente envolvida com a sensação de bem-estar.

COMPONENTES DE DESTAQUE




Estresse




Manejo



Transporte



Competição





NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Magnésio (Min.)	75g
Ômega 3 (Min.)	7.500mg
Ômega 6 (Min.)	10g
Triptofano (Min.)	225g
Vitamina B1 (Min.)	75g

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida dosadora (13,3g) /dia.

Potros e pôneis: ½ medida dosadora (6,6g) /dia.

APRESENTAÇÃO

Pote contendo 400g.

- Apresentação em pó: uso contínuo;
- Pote com rendimento de 30 dias.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Cal-d-mix®

Líquido

NO
DOPING*



Cálcio oral.

Cal-d-mix® é um cálcio oral, contendo os principais elementos para o crescimento ideal dos animais. Sua formulação contém cálcio, fósforo, zinco, selênio, vitamina E, vitamina A, vitamina B12 e vitamina D3, balanceados de forma a atender às necessidades nutricionais dos animais.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplemento vitamínico e mineral, indicado para equinos, muares, asininos e suínos, em estado nutricional inadequado. Também indicado na suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas em perfeito equilíbrio.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equinos, muares e asininos: 50 a 100mL ao dia.

Potros e pôneis: 50mL ao dia.

Suínos adultos: 40mL ao dia.

Leitões: 5 a 10mL ao dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Cálcio (Min.)	35g
(Máx.)	41,18g
Fósforo (Min.)	26,6g
Zinco (Min.)	3.300mg
Selênio (Min.)	20mg
Vitamina A (Min.)	1.200.000UI
Vitamina B12 (Min.)	33.000mcg
Vitamina D3 (Min.)	75.000UI
Vitamina E (Min.)	20.000UI

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 1L.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Creatina®

NO
DOPING*

Força e resistência máximas.

A **Creatina®** tem a função de suplemento de ATP, fonte essencial de energia. A creatina-fosfato constitui-se na maior reserva de energia, prevenindo a depleção rápida de ATP, através da oferta imediata de fosfatos de alta energia para regeneração a partir de ADP. Desta forma, evita-se a falta de energia.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplementação de creatina para equinos.

MODO DE USAR

Cavalos adultos (500Kg):

- Dose inicial: administrar 120g/dia durante 14 dias.
- Dose manutenção: 40g/dia.

**

Glicina/Arginina/Metionina



Creatina

A creatina promove a ressíntese
do ATP a partir do ADP.

**A creatina é um peptídeo formado por 3 aminoácidos: glicina, arginina e metionina; sua formação ocorre pela complexação entre a arginina e a glicina no rim, levando à formação de um outro composto; o guanidinoacetato. Este, por sua vez, vai para o fígado, onde, ao passar por uma reação química (metilação), forma finalmente a creatina.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Creatina (Min.) 800g

APRESENTAÇÃO

Potes contendo 500g e 2kg.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Eletrolítico®

CENOURA *booster*

NO
DOPING*

Repositor de eletrólitos.

Eletrolítico® e **Eletrolítico® Booster** combinam carboidratos simples e complexos que fornecem energia e elevam, gradualmente, a taxa de glicose no sangue, possibilitando boa fonte de energia durante toda a prática esportiva ou em casos de desidratação.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para equinos, muares, asininos e suínos na suplementação de eletrólitos perdidos, principalmente durante os exercícios físicos. Para os equídeos, também está indicado no auxílio à restauração do equilíbrio hidroeletrólítico, promovendo a recuperação após o exercício, constituindo-se um reforço energético e de fácil assimilação.

MODO DE USAR

Eletrolítico®:

- Equinos, muares e asininos adultos: 40g diluídos em 4 litros de água.
- Potros e pôneis: 10g diluídos em 1 litro de água.
- Suínos adultos: 10g diluídos em 1 litro de água.
- Leitões: 2,5g diluídos em 250mL de água.

Administrar a dose recomendada 4 a 6 horas antes do exercício físico. A mesma dosagem poderá ser repetida durante e após o exercício físico.

Caso o animal se recuse a beber:

- Equinos, muares e asininos adultos: a dose de 40g poderá ser diluída em 100mL de água e administrada em uma seringa por via oral.
- Potros, pôneis e suínos adultos: a dose de 10g poderá ser diluída em 25mL de água e administrada em uma seringa por via oral.
- Leitões: 2,5g diluídos em 6mL de água e administrada em uma seringa por via oral.

Deixar água à disposição dos animais durante a utilização do **Eletrolítico®**. O produto também pode ser administrado na ração.

Eletrolítico® Booster:

Para ser usado por via oral.

- Equinos, muares, asininos e suínos: administrar 5g do produto para cada 100kg de peso corporal. A administração de **Eletrolítico®** deve ser feita 4 a 6 horas antes do exercício físico ou de acordo com as necessidades eletrólíticas do animal com condição nutricional inadequada. A mesma dosagem poderá ser repetida durante e após o exercício físico. Deixar água à disposição dos animais durante e após a utilização do produto.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

ELETROLÍTICO®:

Cálcio (Máx.)	5.250mg
(Min.)	4.750mg
Cloro (Min.)	325g
Magnésio (Min.)	10,8g
Potássio (Min.)	60,6g
Sódio (Min.)	167,3g
Maltodextrina (Min.)	150g

ELETROLÍTICO® BOOSTER:

Cálcio (Máx.)	7.560mg
(Min.)	7.200mg
Cloro (Min.)	322,29g
Glicina (Min.)	30g
Magnésio (Min.)	8.500mg
Potássio (Min.)	52,44g
Sódio (Min.)	160g
Fruto-oligosacarídeos	10g
Maltodextrina (min.)	30g

APRESENTAÇÃO

Pote contendo 650g e seringas contendo 50g.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*



E-S-E®

NO
DOPING*



Vitamina E e selênio para os músculos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Na suplementação de vitamina E e selênio para equinos, muares, asininos, suínos e avestruzes em estado nutricional inadequado.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral:

Equídeos (equinos, muares e asininos): 20g ou 20mL/dia.

Potros e pôneis: 10g ou 10mL/dia.

Avestruzes adultos: 10g ou 10mL/dia.

Avestruzes filhotes: 2g ou 2mL/dia.

Suínos adultos: 7,5g ou 7,5mL/dia.

Leitões: 3g ou 3mL/dia.

CADA Kg CONTÉM:

E-S-E SUPER pó

Vitamina E (Min.)	125.000UI
Lisina (Min.)	100g
Selênio (Min.)	150mg

E-S-E liquid

Vitamina E (Min.)	125.000UI
Lisina (Min.)	100g
Selênio (Min.)	75mg

APRESENTAÇÃO

Pote plástico contendo 500g e frasco dosador contendo 1L.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Glicopan[®]

Energy

NO
DOPING*

Rápida resposta com glicina, lisina, colina, betaína e carnitina.

Glicopan® Energy combina aminoácidos prontamente assimiláveis, colina e glicose, auxiliando no estímulo de apetite e de ganho de massa corporal.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Na suplementação de aminoácidos e energia para equinos, muares, asininos e suínos. Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance atlética.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equinos, muares e asininos adultos: 25mL, duas vezes ao dia.

Potros de sobreano: 15mL, duas vezes ao dia.

Potros e pôneis: 10mL, duas vezes ao dia.

Suínos adultos: 5mL, duas vezes ao dia.

Leitões: 1mL, duas vezes ao dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Ácido aspártico (Min.)	9.791mg	Isoleucina (Min.)	2.113mg
Ácido glutâmico (Min.)	19,149g	L-carnitina (Min.)	20g
Alanina (Min.)	22,186g	Leucina (Min.)	7.292mg
Arginina (Min.)	7.647mg	Lisina (Min.)	29,892g
Betaina (Min.)	9.790mg	Metionina (Min.)	14,564g
Cisteína (Min.)	450mg	Prolina (Min.)	27,977g
Colina (Min.)	10g	Serina (Min.)	1.318mg
Fenilalanina (Min.)	4.874mg	Tirosina (Min.)	1.245mg
Glicina (Min.)	49,749g	Treonina (Min.)	404,8mg
Glicose (Min.)	200g	Triptofano (Min.)	520mg
Histidina (Min.)	1.179mg	Valina (Min.)	4.374mg

APRESENTAÇÃO

Frasco dosador de 1L e refil de 5L.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Hepvet[®]

Equinos



Recuperação metabólica em equinos.

Hepvet[®] Equinos contém elementos importantes para auxiliar na recuperação física de animais submetidos a condições extremas de exercício e estresse metabólico. Disponível em pó ou pasta, facilitando a administração do produto.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado em condições extremas de exercício e estresse metabólico (treinamento, competições, transporte, exposições) ou períodos de recuperação física.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Combinação de 20 elementos importantes para o suporte à recuperação de animais submetidos a situações extremas;
- Ação antioxidante;
- Componentes precursores da glutathione, auxiliando na capacidade de recuperação metabólica;

- Vitaminas do complexo B, C e E;
- Zinco quelatado e selênio;
- Ação no metabolismo energético;
- Apresentação em pasta: seringa dosadora de fácil administração.

MODO DE USAR

Pasta:

Para ser usado via oral:

- Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida (13g)/dia.
- Potros: ½ medida (6,5g)/dia.

Pó:

Para ser usado via oral:

- Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida dosadora (16,7g)/dia.
- Potros: ½ medida dosadora (8,3g)/dia.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

HEPVET EQUINOS PASTA

Ácido nicotínico (min.)	5.385mg
Arginina (min.)	38,46g
Cinarina (min.)	61mg
Cisteína (min.)	1.154mg
Colina (min.)	7.692mg
Extrato de alcachofra (min.)	11,53g
Extrato de cardo-mariano (min.)	96,15g
Glicina (min.)	38,46g
Inositol (min.)	7.692mg
Glutamina (min.)	7.692mg
Pantotenato de cálcio (min.)	34,61g
Selênio (min.)	77mg
Taurina (min.)	7.692mg
Vitamina B1 (min.)	38,46g
Vitamina B12 (min.)	307.692mcg
Vitamina B2 (min.)	5.385mg
Vitamina B6 (min.)	15,38g
Vitamina C (min.)	7.692mg
Vitamina E (min.)	7.692UI
Zinco quelatado (min.)	1.154mg

HEPVET EQUINOS PÓ

Ácido nicotínico (min.)	4.200mg
Arginina (min.)	30g
Cinarina (min.)	48mg
Cisteína (min.)	900mg
Colina (min.)	6.000mg
Extrato de alcachofra (min.)	9.000mg
Extrato de cardo-mariano (min.)	75g
Glicina (min.)	30g
Inositol (min.)	6.000mg
Glutamina (min.)	6.000mg
Pantotenato de cálcio (min.)	27g
Selênio (min.)	60mg
Taurina (min.)	6.000mg
Vitamina B1 (min.)	30g
Vitamina B12 (min.)	240.010mcg
Vitamina B2 (min.)	4.200mg
Vitamina B6 (min.)	12g
Vitamina C (min.)	6.000mg
Vitamina E (min.)	6.000UI
Zinco quelatado (min.)	900mg

APRESENTAÇÃO

Potes contendo 500g e seringas dosadoras contendo 39g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Hemolitan®

NO
DOPING*



Vitaminas e minerais em alta concentração.

Hemolitan® é um suplemento que combina em sua formulação todas as vitaminas e oligoelementos que participam direta ou indiretamente do metabolismo celular, principalmente de células sanguíneas e de outras de rápida multiplicação.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplemento líquido para equinos, muare, asininos e suínos, contendo todos os elementos para suplementar animais em condição nutricional inadequada. Indicado também durante a fase de crescimento.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral.

Equinos, muare e asininos adultos: 20mL por dia.

Potros recém-nascidos: 10mL no 2º, 6º e 12º dias após o nascimento.

Potros e pôneis: 15mL por dia.

Suínos adultos: 5mL por dia.

Leitões: 1mL por dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Vitamina B1 (Min.)	1.500mg
Vitamina B2 (Min.)	1.500mg
Vitamina B6 (Min.)	1.200mg
Vitamina B12 (Min.)	15.000mcg
Vitamina K3 (Min.)	250mg
Pantotenato de cálcio (Min.)	1.200mg
Ácido nicotínico (Min.)	1.200mg
Ácido fólico (Min.)	5.000mg
Ferro (Min.)	4.500mg
Cobalto (Min.)	100mg
Cobre (Min.)	500mg
Zinco (Min.)	5.000mg
Glicose (Min.)	200g

APRESENTAÇÃO

Frasco dosador de 500mL, 1L e refil de 5L.



**Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.*

Organew®

NO
DOPING*



Probiótico + Prebiótico.

Organew® reúne em sua formulação vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS e leveduras vivas. Esta perfeita combinação auxilia no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplemento contendo aminoácidos, vitaminas, leveduras e prebiótico, indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo do apetite, melhora na conversão alimentar e no desempenho reprodutivo.

Organew® contém leveduras vivas, FOS e MOS que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Auxílio na digestão e absorção de nutrientes;
- Produção de vitaminas do grupo B;
- Restauração da microbiota intestinal.

Entre os principais prebióticos estudados na nutrição animal estão os fruto-oligosacarídeos (FOS) e os mananoligosacarídeos (MOS), que estimulam seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais bactérias benéficas.

MODO DE USAR

Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento.

Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos: 5 a 10g, uma vez ao dia.

Ovinos, caprinos e avestruzes: 2,5 a 5g, uma vez ao dia.

Suínos: 2,5 a 5g, uma vez ao dia, ou 1 a 2g por kg de ração

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Proteína bruta (Min.)	178,6g	Histidina (Min.)	3.526mg
Extrato etéreo (Min.)	28,3g	Arginina (Min.)	9.770mg
Matéria fibrosa (Máx.)	500 mg	Ácido aspártico (Min.)	18,11g
Matéria mineral (Máx.)	61,0g	Treonina (Min.)	7.699mg
Umidade (Máx.)	100g	Serina (Min.)	9.803mg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9 x 10 ⁹ UFC	Ác. glutâmico (Min.)	20,36g
Mananoligosacarídeos	1.000mg	Prolina (Min.)	7.327mg
Fruto-oligosacarídeos	2.000mg	Glicina (Min.)	8.481mg
Vitamina B1 (Min.)	5,4mg	Alanina (Min.)	11,97g
Vitamina B2 (Min.)	19mg	Cistina (Min.)	2.461mg
Vitamina B6 (Min.)	11,2mg	Valina (Min.)	9.668mg
Vitamina B12 (Min.)	24mcg	Metionina (Min.)	6.649mg
Biotina (Min.)	2,8mg	Isoleucina (Min.)	8.740mg
Ácido fólico (Min.)	10mg	Leucina (Min.)	13,3g
Colina (Min.)	750mg	Tirosina (Min.)	4.570mg
Ácido nicotínico (Min.)	20,30mg	Fenilalanina (Min.)	7.130mg
Lisina (Min.)	16,68g		

APRESENTAÇÃO

Bolsas metalizadas com 1kg do produto com medida dosadora e saco de 20kg.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional).
Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Organew®

Pasta

NO
DOPING*

Probiótico + Prébiótico em Pasta.

Organew® Pasta é composto por vitaminas, aminoácidos e elementos pró e prebióticos para auxiliar no desenvolvimento e manutenção de uma microbiota intestinal saudável, contribuindo com a melhora da digestibilidade dos nutrientes da dieta e aumento da eficiência alimentar.

DESTAQUES

- **Prebióticos FOS (Fruto-oligossacarídeos) e MOS (Mananoligossacarídeos):** estimulam seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais bactérias benéficas;
- **Betaglucanos:** auxiliam nas defesas da parede intestinal;
- **Saccharomyces cerevisiae:** leveduras vivas para um desenvolvimento adequado da microbiota intestinal;
- **Palatável:** sabor baunilha.

INDICAÇÃO

Indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo do apetite, melhora da conversão alimentar e do desempenho reprodutivo. Contém leveduras vivas, FOS e MOS, que auxiliam no desenvolvimento e manutenção de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade nutricional e aumento da eficiência alimentar.

MODO DE USAR

Organew® Pasta deve ser fornecido diretamente na boca do animal.

Equinos, muares e asininos: 4 a 8g, 1x/dia;

Suínos: 2 a 4g, 1x/dia.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Proteína bruta (Min.)	140,5g	Alanina (Min.)	7.600mg
Umidade (Máx.)	19g	Arginina (Min.)	6.300mg
Matéria Mineral (Máx.)	228,7g	Cistina (Min.)	2.300mg
Fibra Bruta (Máx.)	1,5g	Fenilalanina (Min.)	5.400mg
Extrato Etéreo (Min.)	475,4g	Glicina (Min.)	6.200mg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2,5x 10 ¹⁰ UFC	Histidina (Min.)	3.400mg
FOS	4.500mg	Isoleucina (Min.)	6.300mg
MOS	450mg	Leucina (Min.)	9.300mg
Betaglucanos (Min.)	500mg	Lisina (Min.)	16,4g
Vitamina B1 (Min.)	8,49mg	Metionina (Min.)	5.700mg
Vitamina B2 (Min.)	23,55mg	Prolina (Min.)	4.800mg
Ácido Nicotínico (Min.)	24,63mg	Serina (Min.)	7.000mg
Vitamina B6 (Min.)	17,33mg	Tirosina (Min.)	5.600mg
Biotina (Min.)	3,74mg	Treonina (Min.)	6.400mg
Vitamina B12 (Min.)	30,00mcg	Valina (Min.)	7.200mg
Ácido Aspártico (Min.)	12,8g	Colina	919,13mg
Ácido Fólico (Min.)	11,31mg	Inositol	1.200mg
Ácido Glutâmico (Min.)	13,9g		

APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 32g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Promater[®]

NO
DOPING⁺

Auxilia na reprodução.

Promater[®] é um suplemento reprodutivo composto por vitaminas, minerais, aminoácidos, betacaroteno, L-carnitina e ômega 3, 6 e 9.

Promater[®] reúne os nutrientes específicos que desempenham um importante papel reprodutivo.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplemento indicado para equinos, asininos, ovinos, caprinos, avestruzes e suínos em fase de reprodução. Indicado também para fêmeas na fase de gestação ou postura. Possui elementos fundamentais para a reprodução, entre eles, betacaroteno, L-carnitina e ácidos graxos, como ômega 3 (ácido linolênico), ômega 6 (ácido linoleico) e ômega 9 (ácido oleico).

MODO DE USAR

Líquido:

Para ser usado por via oral.

- Equinos, muas e asininos: 20mL/dia.
- Suínos: 7,5mL/dia.
- Avestruzes: 5mL/dia.

Pó:

Para ser utilizado por via oral, adicionado ao alimento ou ração.

- Bovinos, equinos e asininos: 20g/dia.
- Ovinos e caprinos: 10g/dia.



NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Líquido

Vitamina A (Min.)	800.000 UI
Vitamina B12 (Min.)	17.000mcg
Vitamina E (Min.)	43.000 UI
Ácido aspártico (Min.)	490mg
Ácido fólico (Min.)	20g
Ácido glutâmico (Min.)	885mg
Ácido linoleico (Min.)	240,266g
Ácido linolênico (Min.)	50,161g
Ácido oleico (Min.)	118,423g
Alanina (Min.)	766mg
Arginina (Min.)	536mg
Fenilalanina (Min.)	196mg
Glicina (Min.)	2.129mg
Hidroxiprolina (Min.)	698mg
Histidina (Min.)	102mg
Isoleucina (Min.)	128mg
L-carnitina (Min.)	110,88g
Leucina (Min.)	298mg
Lisina (Min.)	10g
Metionina (Min.)	10g
Prolina (Min.)	1.166mg
Serina (Min.)	145mg
Tirosina (Min.)	110mg
Treonina (Min.)	85mg
Valina (Min.)	221mg
Betacaroteno (Min.)	2.700mg
Zinco (Min.)	4.000mg
Selênio (Min.)	152mg
Extrato proteico vegetal (Min.)	10g

Pó

Vitamina A (Min.)	1.600.000 UI
Vitamina B12 (Min.)	17.000mcg
Vitamina E (Min.)	43.000 UI
Betacaroteno (Min.)	5.400mg
Ácido fólico (Min.)	20g
Ácido aspártico (Min.)	28g
Ácido glutâmico (Min.)	36,7g
Alanina (Min.)	18,9g
Arginina (Min.)	13,8g
Serina (Min.)	15,1g
Tirosina (Min.)	8.600mg
Treonina (Min.)	13,9g
Valina (Min.)	15,8g
Cistina (Min.)	1.400mg
Fenilalanina (Min.)	12,2g
Glicina (Min.)	16,6g
Histidina (Min.)	6.800mg
Isoleucina (Min.)	14,8g
L-carnitina (Min.)	7.840mg
Leucina (Min.)	20,5g
Lisina (Min.)	97g
Metionina (Min.)	25,5g
Prolina (Min.)	13,3g
Ômega 3 (Min.)	1.175mg
Ômega 6 (Min.)	350mg
Ácido oleico (Min.)	475mg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 ⁹ UFC

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 1L e pote contendo 1kg.

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Probiótico®

Equinos Vetnil

NO DOPING*



Para uma flora microbiana saudável.

O **Probiótico® Vetnil** é composto por bactérias benéficas naturalmente presentes no trato intestinal dos animais.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Como recompor a microbiota intestinal em equinos, principalmente em ocasiões tais como:

- Nascimento (para rápida colonização da flora intestinal);
- Transporte (para evitar o desequilíbrio da flora intestinal proporcionando melhor aproveitamento nutricional);
- Estresse (leilões, feiras, exposições, mudança de ambiente, desmama, troca de alimentação, castração, vacinação e outros).

MODO DE USAR

Probiótico® Vetnil deve ser aplicado diretamente na boca do animal.

Animais recém-nascidos: 2g.

Animais adultos: 4g.

Fazer uso de forma contínua, ou a critério do técnico responsável pelos animais.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

<i>Bifidobacterium bifidum</i> (Min.)	3,33 X 10 ⁷ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (Min.)	1,66 X 10 ⁷ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Min.)	3,33 X 10 ⁷ UFC/g
<i>Lactobacillus plantarum</i> (Min.)	1,66 X 10 ⁷ UFC/g
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Min.)	3,33 X 10 ⁸ UFC/g

APRESENTAÇÃO

Seringas contendo 34g do produto.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.

Vita-vet C[®] Pó

NO DOPING*



Vitamina C buferinizada*.

Vitamina C revestida e buferinizada para melhor proteger a mucosa gástrica, somente sendo liberada para absorção no intestino delgado. A vitamina C é um antioxidante que atua especificamente nos líquidos orgânicos, eliminando os radicais livres. O excesso de radicais livres diminui a resistência física, causando a diminuição de performance.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplementação de vitamina C para equinos, muares, asininos, avestruzes e suínos.

MODO DE USAR

Para ser adicionado ao alimento.

Equinos, muares e asininos: 50g/dia.

Potros e pôneis: 10g/dia.

Avestruzes adultos: 10g/dia.

Avestruzes filhotes: 2g/dia.

Suínos: 5g/dia.

Leitões: 1g/dia.

*Buferinizada: revestimento na vitamina C que impede a irritação gástrica

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Vitamina C (Min.)	500g
Cálcio (Min.)	47,50g
(Máx.)	52,50g
Glicose (Min.)	334g

APRESENTAÇÃO

Pote contendo 500g.



*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.



Use um leitor de QR CODE e
saiba mais sobre a Vetnil



/VETNIL

@vetnilpet

@vetnilequinos

Av. José Nicolau Stabile, 53. Bairro Burck
Louveira • São Paulo • Brasil • CEP 13290-000
SAC 0800-109 197 • vetnil@vetnil.com.br
www.vetnil.com.br

